УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ГРУЗИИ ПО ИЗОТОПНЫМ ДАННЫМ ($\delta^{18}\text{O}$, δD , $\delta^{13}\text{C}_{\text{CO}_2}$, $\delta^{13}\text{C}_{\text{CH}_4}$, $\delta^{15}\text{N}$)

Киквадзе О.Е.¹, Лаврушин В.Ю.¹, Айдаркожина А.¹, Меликадзе Г.²

¹Геологический институт РАН, Москва, Россия, E-mail: bolik2000@mail.ru, v_lavrushin@ginras.ru

²Институт геофизики им. М. Нодия, Тбилиси, Грузия

АННОТАЦИЯ: Исследован химический и изотопный составы минеральных вод Грузии. Значения $\delta^{18}\text{O}$ и δD в них изменяются от +0,7 до +10,0‰ и от -37 до -13‰ (соответственно). Значения $\delta^{13}\text{C}_{\text{CO}_2}$ и $\delta^{13}\text{C}_{\text{CH}_4}$ в изученных водопрооявлениях варьируют от -37,8 до +8,4‰ и от -63,1 до -34,5‰, соответственно. В газах минеральных вод Грузии впервые определены изотопные характеристики азота. Значения $\delta^{15}\text{N}$ варьируют от -4,0 - +2,4‰. Большое число проб характеризуется значениями $\delta^{15}\text{N}$, близкими к атмосферному воздуху ($\delta^{15}\text{N} \sim 0$ ‰). Оценки температур формирования вод показали, что солевой комплекс минеральных вод формируется на глубинах, превышающих 1,5 км.

1. ВВЕДЕНИЕ

На территории Грузии существует более тысячи как естественных выходов минеральных вод, так и вскрытых скважинами. Водопрооявления охватывают пять основных структурных единиц, принимающих участие в геологическом строении Грузии – доюрские интенсивно складчатые глубокометаморфизованные образования зоны Главного Кавказского хребта, сложноскладчатую систему его Южного склона, платформенные и полуплатформенные образования Грузинской глыбы с доюрскими выступами фундамента, умеренно-складчатую Аджаро-Триалетскую складчатую систему и Артвино-Болнийскую глыбу [5]. Геологические и гидрохимические особенности региона отражаются в пестром химическом составе подземных вод. Условно, по особенностям геохимических характеристик вод и преобладанию природных газов ранее выявлена зональность распространения вод по составу выделяемых газов [1]. В северной и южных частях региона, приуроченных к складчатым сооружениям Большого и Малого Кавказа преобладают углекислые воды. В центральной части Грузии в газовом составе компоненты CO_2 , N_2 , CH_4 образуют всевозможные комбинации. Такая пестрота является отражением блокового строения региона и относительно спокойной тектоники мезо-кайнозойского осадочного чехла. В Кахетии, восточной части Грузии преобладают воды, в газах которых метан достигает 98% об. Наряду с метановыми водами, также встречаются и азотные.

2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

В основу работы положены материалы опробования минеральных вод, проведенного в августе 2017 года (72 пункта). Концентрации главных компонентов (CH_4 , CO_2 , N_2 , O_2 , H_2) определялись в лаборатории тепломассопере-

носа ГИН РАН. Значения $\delta^{13}\text{C}(\text{CO}_2, \text{CH}_4)$ определялись в Лаборатории геохронологии и стабильных изотопов ГИН РАН, а также изотопный состав водорода и кислорода выполнялся в ГИН РАН (г. Москва) на масс-спектрометре DELTAplus фирмы ThermoQuest (Finnigan). Значения δD и $\delta^{18}\text{O}$ приведены в ‰ относительно SMOW.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ

По величине минерализации большинство исследованных вод слабо- и среднеминерализованные. Минерализация варьирует от 0,26 до 52,23 г/л, в среднем по опробованным водам минерализация составляет 7,8 г/л (рис.1). Наиболее минерализованные воды отмечаются в восточной части Грузии в Кахетии.

Рис. 1. Гистограмма распределения величин минерализации вод (М) Грузии.

Воды характеризуются большим разнообразием типов солевого состава (рис. 2). Большая часть изученных вод имеют гидрокарбонатно-натрий-кальциевый тип с ростом минерализации тип меняется на хлоридно-гидрокарбонатно-натриевый. Такая тенденция отражает увеличение роли осадочных комплек-

сов юрско-мелового возраста в формировании ионно-солевого состава вод.

Рис. 2. Диаграмма распределения анионного и катионного составов (мг-экв%) минеральных вод Грузии.

Углекислые воды преимущественно холодные ($t_b=5-16^{\circ}\text{C}$) с бурным газоотделением. Высокие концентрации углекислоты указывают на генетическую связь магматических и метаморфических процессов с присутствием CO_2 . Термальные воды до 98°C проявлены в меньшей степени и характеризуются метаново-азотным и азотным составами газов. В восточной и западной частях Грузии воды преимущественно метановые гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые, величина минерализации достигает 52,2 г/л. Температура вод на поверхности варьирует от 16,2 до $51,2^{\circ}\text{C}$.

Для региона оценены температуры формирования солевого состава вод с помощью SiO_2 гидрохимического геотермометра [6]. Они варьируют от 42 до 154°C . Высокие концентрации кремния, бора, железа, щелочных и щелочноземельных металлов, также указывают на взаимодействие вод с породами при повышенных температурах и подтверждают предположение об активности процессов, проходящих в системе «вода-порода». Формирование солевого комплекса минеральных вод происходит на глубинах, превышающих 1,5 км.

Значения $\delta^{18}\text{O}_{\text{H}_2\text{O}}$ меняются от -14,9 до +9,4 ‰, а δD от -110,3 до -20,0 ‰. Как видно из рисунка 3, почти все исследованные водопрооявления, несмотря на региональные различия в химическом составе вод, образуют единый тренд значений $\delta^{18}\text{O}$ и δD , совпадающий с линией атмосферных осадков (Крейга). Однако намечаются некоторые различия в изотопном составе между группами различного генезиса.

Углекислые низко- и среднеминерализованные воды Южного склона Большого Кавказа характеризуются средним значением $\delta^{18}\text{O}_{\text{H}_2\text{O}} = -11,6\text{‰}$, углекислые средне-минерализованные воды Аджаро-Триалетской складчатой зоны - -11,9‰.

Рис. 3. Соотношения величин $\delta^{18}\text{O}$ и δD в минеральных водах Грузии.

Термальные низкоминерализованные воды Грузинской глыбы - -9,0‰. Отклонения значений от линии метеорных вод $\delta^{18}\text{O}_{\text{H}_2\text{O}}$ до +10,2‰ обнаружены в пробах метановых вод и вод грязевых вулканов Кахетии, которые по химическим параметрам содержат примесь и вод, имеющих конденсационное происхождение. Отмечается положительная корреляция $\delta^{18}\text{O}_{\text{H}_2\text{O}}$ с ростом общей минерализации (рис. 4). Что указывает на влияние на значения $\delta^{18}\text{O}$ процессов смешения с седиментационными водами.

Значения $\delta^{13}\text{C}_{\text{CO}_2}$ в изученных водопрооявлениях варьируют от -37,8 до +8,4‰. Самые легкие значения изотопного состава углекислоты - 37,8, -25,5, -23,5‰ характерны для азотных и азотно-метановых газов и указывают на присутствие в газах углекислоты, образующейся при окислении органики.

Изотопные исследования углерода углекислоты в сопоставлении с геологическими условиями формирования вод позволяют выделить в глубинной (вулканической) углекислоте мантийную составляющую с $\delta^{13}\text{C}_{\text{CO}_2} = -8 - -3\text{‰}$ и метаморфическую составляющую с $\delta^{13}\text{C}_{\text{CO}_2} = 0 \pm 2\text{‰}$.

На Большом Кавказе углекислота с мантийными значениями $\delta^{13}\text{C}$ отмечена в зоне региональных разломов и районах вулканических областей. Это подтверждается полученными ранее изотопно-гелиевыми критериями оценки мантийной составляющей в природных флюидах. Особенно она заметна в центральном сегменте Большого Кавказа вблизи новейших вулканических центров Казбека и Эльбруса, где максимальные значения $^3\text{He}/^4\text{He}$ приближаются к уровню, свойственному MORB, достигая $0,84 \times 10^{-6}$ [3].

Рис. 4. Соотношение величин $\delta^{18}\text{O}_{\text{H}_2\text{O}}$ и минерализации (М) в водах Грузии.

Значение $\delta^{13}\text{C}$ в метане варьирует от -63,1 до -34,5‰. Такие различия состава связаны с разными генетическими условиями образования метана: связанные с нефтью (Какетия), образованные в результате катагенеза (Тбилисский район) и образованный при биохимических процессах (Колхидская низменность).

В газах минеральных вод Грузии впервые определены изотопные характеристики азота. Значения $\delta^{15}\text{N}$ варьирует от -4,0 до +2,4‰. Большое число проб характеризуется значениями $\delta^{15}\text{N}$, близкими к атмосферному воздуху ($\delta^{15}\text{N} \sim 0\text{‰}$). Это может быть связано с контаминацией проб газа воздушным компонентом при взаимодействии инфильтрационных и минеральных вод. Тем не менее, намечается прямая зависимость значений $\delta^{15}\text{N}$ от концентрации азота в составе газов. Она указывает на активное участие неатмогенного азота в формировании газовой фазы минеральных вод Грузии. Из-за большой неоднородности геологических обстановок рассматриваемой территории интерпретация этих результатов неоднозначна, особенно в плане оценки роли мантийного N_2 в составе газов ($\delta^{15}\text{N} = -5 \pm 2\text{‰}$ [4]). Отрицательные

значения $\delta^{15}\text{N}$ встречаются, как в углекислых газах в районах проявления новейшего вулканизма (Казбекская и Эльбрусская вулканические области), так и в газах азотно-метанового состава, вскрываемых в осадочных комплексах Рионской и Верхне-Куринской межгорных впадин [2]. Мы предполагаем, что наблюдаемые в углекислых газах отрицательные значения $\delta^{15}\text{N}$ могут отражать присутствие мантийного азота, т.к. в этих же районах фиксируются и высокие значения $^3\text{He}/^4\text{He}$. В межгорных же впадинах он, скорее всего, образуется совместно с углеводородами и может здесь в зависимости от типа исходного органического вещества и условий денитрификации характеризоваться как отрицательными, так и положительными значениями $\delta^{15}\text{N}$.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В зависимости от генетических процессов, развитых на тех или иных месторождениях следует подразделить многообразие грузинских минеральных вод по изотопно-химическим характеристикам газовой и водной фазы на 3 группы: 1. Вулканогенные (углекислые), 2. Седиментогенные (метановые) и 3. Термальные (азотные и метаново-азотные). Все они могут содержать ту или иную примесь атмогенных вод. Максимальная доля последних в водном балансе характерна для вулканогенных (углекислых) вод, формирующихся в пределах горноскладчатых систем Большого и Малого Кавказа.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-05-00486).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Буачидзе Г.И., Мхеидзе Б.С. Природные газы Грузии. – Тбилиси: «Мецниереба», 1989. – 155 с.
2. Лаврушин В.Ю., Поляк Б.Г., Покровский Б.Г. и др. Изотопно-геохимические особенности газов грязевых вулканов Восточной Грузии // Литология и полезные ископаемые – № 2. – 2009. – С. 203-218.
3. Поляк Б.Г., Лаврушин В.Ю., Киквадзе О.Е., Иоффе А.И. Изотопы гелия в подземных флюидах Кавказского региона // Мониторинг (наука и технологии) – №1. (10). – 2012. – С. 28-42.
4. Cartigny P., Marty B. Nitrogen Isotopes and Mantle Geodynamics: The Emergence of Life and the Atmosphere–Crust–Mantle Connection // Elements – V. 9. – 2013. – P. 359-366.
5. Gudjabidze, G.E. Geological Map of Georgia. Scale 1:500 000. Georgian State Department of Geology, Tbilisi. – 2003.
6. Fournier R.O. Chemical geothermometers and mixing models for geothermal systems // Geothermics – V. 5. – 1977. – P. 41-50.

THE CONDITIONS FOR GENERATION OF GEORGIA'S MINERAL WATERS BY ISOTOPIC DATA ($\delta^{18}\text{O}$, δD , $\delta^{13}\text{C}_{\text{CO}_2}$, $\delta^{13}\text{C}_{\text{CH}_4}$, $\delta^{15}\text{N}$)

Kikvadze O.E.¹, Lavrushin V.Yu.¹, Melikadze G.¹, Aidarkozhina A.²

¹ *Geological Institute of RAS, Moscow, Russia, E-mail: bolik2000@mail.ru, v_lavrushin@ginras.ru*

² *Institute of Geophysics, Tbilisi, Georgia*

ABSTRACT: The chemical and isotope compositions of Georgia's mineral waters have been studied. The values of $\delta^{18}\text{O}$ and δD in them vary from +0.7 to +10.0‰ and from -37 to -13‰ (respectively). The values of $\delta^{13}\text{C}_{\text{CO}_2}$ and $\delta^{13}\text{C}_{\text{CH}_4}$ in the studied water manifestations range from -37.8 to +8.4 ‰ and from -63.1 to -34.5‰, respectively. The isotope characteristics of nitrogen were determined for the first time in the gases of Georgia's mineral waters. The value of $\delta^{15}\text{N}$ varies from -4.0 - + 2.4‰. A large number of samples is characterized by $\delta^{15}\text{N}$ values close to atmospheric air ($\delta^{15}\text{N} \sim 0$ ‰). Estimates of the water generation temperatures have shown that the salt complex of mineral waters is formed at depths exceeding 1.5 km.